

Behandlungspfad akuter Migräneanfall

Symptome:

intermittierender, pulsierender, pochender Kopfschmerz; häufig im Nacken beginnend
 Aura (10-15%); meist Hemicranie; Holocranie (ca. 30%); Übelkeit (80%)
 Lichtscheu (60%); Lärmempfindlichkeit (50%); Erbrechen (40-50%); Hypergeusie (10%)
 Dauer: 4-72 Stunden

Diagnostik:

Differentialdiagnostik:

Anamnese: s.o.
 Klinische internistische und neurologische Untersuchung

Verdacht auf sympt. Kopfschmerzen (KS):
 heftigster, bisher nicht gekannter KS,
 Erstmanifestation im Alter größer 40 J.,
 Fieber, Nackensteifigkeit,
 vorausgehende epileptische Anfälle,
 Persönlichkeitsveränderungen, Auftreten
 von fokal-neurologischen Symptomen,
 Änderung der bisherigen KS-
 Charakteristik, Trauma in der
 Vorgeschichte

EEG,
 CT,
 MRT,
 evozierte Potentiale

Therapie der Grunderkrankung

Therapie:

leicht

mittel

- Acetylsalicylsäure
- Ibuprofen
- u.U. Metoclopramid

- Acetylsalicylsäure
- Ibuprofen
- Triptane
- u.U. Metoclopramid

und

- Metoclopramid i.V.
- Acetylsalicylsäure i.V.
- Dihydroergotamin s.c.
 (nur: bekannte Wirkung,
 keine NW, k. Dosissteig.)
- Triptane

Allgemeine Massnahmen: Reizabschirmung, Schlaf, lokale Eisbehandlung, Zeitorganisation

Verlauf:

Medikamenten-
 Unverträglichkeit
 Kontraindikationen

